

2026年4月版

0歳の予防接種 ワクチンデビューは、生後2か月の誕生日 スケジュール

0歳の赤ちゃんを VPD(ワクチンで防げる病気)から守るためには、生後2か月になったらできるだけ早くワクチンを受けることが大切です。このスケジュールは NPO 法人 VPD を知って、子どもを守ろうの会によるもっとも早期に免疫をつけるための提案です。

ワクチン名	接種済み ☒	誕生	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳
 B型肝炎 (母子感染予防を除く) 定期	☐ ☐ ☐			①	②					③				
 ロタウイルス 定期	1価 ☐ 5価 ☐ ☐ ☐ ☐			①	②	③								
 小児用肺炎球菌 定期	☐ ☐ ☐ ☐			①	②	③								④
 五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) 定期	☐ ☐ ☐ ☐			①	②	③								④
 BCG 定期	☐						①							
 MR (麻しん風しん) 定期	☐ ☐													①
 水痘 (みずぼうそう) 定期	☐ ☐													①
 おたふくかぜ 任意	☐ ☐													①
 日本脳炎 定期	☐ ☐ ☐ ☐													
 新型コロナ 任意														
 インフルエンザ 任意	毎秋													

 生ワクチン  注射・スタンプ式 定期 定められた期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)。 定期の予防接種の対象年齢  おすすめの接種時期(数字は接種回数)

 不活化ワクチン  経口 任意 多くは有料(自己負担)。自治体によっては公費助成があります。 任意接種の接種できる年齢

 mRNA ワクチン ●異なる種類の注射の生ワクチン同士の接種間隔は最短で4週間です(4週間後の同じ曜日から接種可)。

同時接種: 同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。

国や日本小児科学会も乳幼児の接種部位として太もも(大腿前外側部)も推奨しています。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。詳しい情報は <https://www.know-vpd.jp/> VPD 検索